

# TREFO



**ТЕЧНО ЃУБРИВО СО ОРГАНСКО-ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ  
СО ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ, ЗБОГАТЕНО СО НЕОРГАНСКИ  
ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ СО СПЕЦИФИКИ СОГЛАСНО МНОГУ  
ВИСОКИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ.**

## TREFO BASIS

*Хумични киселини збогатени со 10 N.P.K. единици и микроелементи со оптимален сооднос.*

## TREFO MIX 20

*Хумични киселини збогатени со 20 N.P.K. единици и микроелементи со оптимален сооднос.*

## TREFO AMINA

*Хумични киселини збогатени со азот, протеини, витамини, ензими и фактори за раст.*

## TREFO TREL

*Хумични киселини збогатени со високи концентрации (gr/Lt) од сите хранливи микроелементи.*

## TREFO MAGNE–TREFO FERUM–TREFO ZINCO–TREFO BORO–TREFO MAN

*Или цинк (Zn), или бор (B), или манган (Mn). Хумични киселини со азот (N) и магнезиум (Mg) или железо (Fe)*



## ТИПОВИ НА TREFO

<b>BASIS</b>	<b>5-2-2</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>MIX 20</b>	<b>10-5-5</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>AMINA</b>	<b>5-2-2</b> +M.E. + <b>10% АМИНОКИСЕЛИНИ</b> + <b>ВИТАМИНИ</b> +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>TREL</b>	<b>10-2-2</b> + <b>3% M.E.</b> +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>MAGNE</b>	<b>12-0-0</b> + <b>5MgO</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>FERUM</b>	<b>12-0-0</b> + <b>2Fe</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>ZINCO</b>	<b>12-0-0</b> + <b>2Zn</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>BORO</b>	<b>12-0-0</b> + <b>2B</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ
<b>MAN</b>	<b>12-0-0</b> + <b>Mn</b> +M.E. +5% ХУМИЧНИ КИСЕЛИНИ

# ЗГОЛЕМЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ЗГОЛЕМЕН КВАЛИТЕТ НА ПОЧВАТА - ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ.

СЕРТИФИЦИРАНО, РЕГИСИРАНО ВО ЕУ

## ОСОБЕНОСТИ НА TREFO

**Органско - хумично висококвалитетно течно ѓубриво** збогатено со **неоргански хранливи елементи Н, Р, К, MgO, CaO, B, Fe, Mn, Zn** со многу високи и стандардни спецификации за квалитет.

**Течен хумус**, кондензиран и збогатен со посебен процес на производство. **Многу висока содржина на хумични киселини.**

### ДЕЈСТВО:

- ✓ Ја подобрува микробиолошката активност на почвата.
- ✓ Ги подобрува проблематичните почви, асимилација на врзаните хранливи материи во почвата.
- ✓ Ја подобрува структурата на почвата, циркулацијата на воздухот, капацитетот на водата од влага.
- ✓ Активира, раствора, користи неоргански ѓубрива во почвата.
- ✓ Ја зголемува ефикасноста на фолијарните неоргански ѓубрива.
- ✓ Го зголемува производството и го подобрува квалитетот на производите.
- ✓ Го стимулира и го подобрува растот на корените, забрзувајќи го 'ртењето на семето.
- ✓ Го подобрува 'ртењето, цветањето (го зголемува оплодувањето на цвеќето), како и зреењето на плодот.
- ✓ Го подобрува квалитетот на плодот (големината, слаткоста, бојата, вкусот).
- ✓ Постигнува ран раст.
- ✓ Спречува недостаток на хранливи материи.
- ✓ Ја зајакнува отпорноста на растенијата на болести.

## ПРИМЕНА

### ОПШТИ АПЛИКАЦИИ:

**ФОЛИЈАРНО ЃУБРЕЊЕ:** 1-3 L / 1000 L вода. Повторувајте ја апликацијата на секои 7-14 дена.

**ЃУБРЕЊЕ:** 1-5 L / 1000m<sup>2</sup>. Повторувајте ја апликацијата на секои 7-14 дена.

**ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОЧВАТА:** 5-7 L / 1000m<sup>2</sup>, пред или по сеидбата или садењето.

### СПЕЦИЈАЛНИ АПЛИКАЦИИ:

**ГРАДИНАРСКИ ЗЕЛЕНЧУК:** (домати, краставици, модри патлиџани, артичоки, грав, зелка, карфиол, зелена салата и др.): Ѓубрење со 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup>, на секои 15-20 дена.

**ЛУБЕНИЦИ, ДИЊИ:** Ѓубрење со 2-3 литри / 1000m<sup>2</sup>, 2,5-7 апликации во сезоната на одгледување.

**ПОЛСКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ** (памук, тутун, компири, шеќерна трупка, житарици, пченка, итн.): 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup>, 4-6 апликации, на секои 10-15 дена.

**ОВОШНИ ДРВА НА БАНАНИ-КИВИ-МЛАДИ ДРВА:** 3-5 литри / 1000m<sup>2</sup> во секоја апликација, најмалку 3 апликации во сезоната на одгледување.

**ВИНСКИ ПОЛИЊА-ГРОЗЈЕ:** 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup>, 3-4 апликации во сезоната на одгледување.

**АСПАРАГУС- ЈАГОДИ:** 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup>, 3-4 апликации во сезоната на одгледување

**ДРВЈА:** 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup>, во зависност од возраста на дрвјата, во 3-5 апликации во раните фази на вегетацијата и развивање на плодот. (лиснато или наводнување на коренот)

**ФЛОРОКУЛТУРНИ - УКРАСНИ – ТРЕВНИ РАСТЕНИЈА:** 1-2 литри / 1000m<sup>2</sup> секои 15-20 дена.

**ROOM PLANTS:** Ѓубрење на секои 2 недели со раствор 50 cc/100 литри вода.

**ПРЕПОРАЧАНО:**

Додадете го во течноста за прскање. Во посебни случаи, потребно е специјално прскање. Протресете го пред секоја употреба.

**КОМБИНИРАЊЕ:**

TREFO може да се комбинира со сите хемиски ѓубрива и обичните инсектициди - фунгициди пестициди - убиец на плевелите.

